



Diagnóstico e tratamento dos tumores carcinóides



C PACHECO¹; H DABO²; GABRIELA FERNANDES²; ADRIANA MAGALHÃES²; PEDRO BASTOS³

¹SERVIÇO PNEUMOLOGIA HOSPITAL BRAGA, ²SERVIÇO PNEUMOLOGIA HOSPITAL SÃO JOÃO; ³SERVIÇO CIRURGIA CARDIOTORÁCICA HOSPITAL SÃO JOÃO

INTRODUÇÃO

Os tumores carcinóides são neoplasias pouco comuns com uma incidência crescente.

OBJECTIVO

Análise retrospectiva de dados clínicopatológicos e seguimento de indivíduos diagnosticados com tumores carcinóides pulmonares nos últimos 6 anos.

RESULTADOS

Total de doentes	53
Sexo masculino	58,5%
Sintomas respiratórios	24,5%
NSP em TC tórax	75,5%

Endoscopia respiratória

Alterações endoscópicas	27
Localização brônquio principal	74%
Biópsia com dx	100%
Carcinóides Típicos	10
Carcinóides Atípicos	2
Carcinóides NOS	15

Biópsia transtorácica

Nº doentes que realizou BTT	18
Biópsia com dx	10
Carcinóides Típicos	1
Carcinóides Atípicos	1
Carcinóides NOS	8

Tratamento cirúrgico

Ressecção cirúrgica	46
Lobectomias	31
Pneumectomia	8
Segmentectomias	7
Carcinóides típicos	32
Carcinóides atípicos	14
Kappa ER/Cirurgia	0,85
Kappa BTT/Cirurgia	0,942

Seguimento dos doentes

Sobrevida 5 anos	
T. Carcinóides Típicos	100%
T.Carcinóides Atípicos	85%
Tratamento pós-cirurgia	
Quimioterapia	3
Laser	1

CONCLUSÃO

As características dos tumores carcinóides pulmonares diferem significativamente de outros tumores malignos pulmonares.
A ressecção tumoral completa mantém-se como o principal objectivo no tratamento desta entidade.